

# アマレット®配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分(アムロジピン)**と  
**血液中のコレステロールを低下させる成分**  
**(アトルバスタチン)**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、  
患者様のお薬代の負担が軽減される  
ジェネリック(後発)医薬品です。

裏面もお読み下さい ▶

# アマレット®配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分(アムロジピン)**と  
**血液中のコレステロールを低下させる成分**  
**(アトルバスタチン)**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、  
患者様のお薬代の負担が軽減される  
ジェネリック(後発)医薬品です。

裏面もお読み下さい ▶

# アマレット®配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分(アムロジピン)**と  
**血液中のコレステロールを低下させる成分**  
**(アトルバスタチン)**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、  
患者様のお薬代の負担が軽減される  
ジェネリック(後発)医薬品です。

裏面もお読み下さい ▶

# アマレット®配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分(アムロジピン)**と  
**血液中のコレステロールを低下させる成分**  
**(アトルバスタチン)**の2つが配合されたお薬です。



こちらのお薬は、  
患者様のお薬代の負担が軽減される  
ジェネリック(後発)医薬品です。

裏面もお読み下さい ▶

# アマレット<sup>®</sup>配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**



- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMA(1)002A  
2018年4月作成

# アマレット<sup>®</sup>配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**



- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMA(1)002A  
2018年4月作成

# アマレット<sup>®</sup>配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**



- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMA(1)002A  
2018年4月作成


# アマレット<sup>®</sup>配合錠1番/2番/3番/4番「EE」

## 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**



- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなる場合があります)



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE AMA(1)002A  
2018年4月作成