

ブスター[®]M錠10/20

を服用される患者様へ

この薬の成分名は**ファモチジン**です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

チェック

<10mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

チェック

<20mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収 ふわっと崩れる



エルメッド エーザイ株式会社 エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

ブスター[®]M錠10/20

を服用される患者様へ

この薬の成分名は**ファモチジン**です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

チェック

<10mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

チェック

<20mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収 ふわっと崩れる



エルメッド エーザイ株式会社 エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

ブスター[®]M錠10/20

を服用される患者様へ

この薬の成分名は**ファモチジン**です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

チェック

<10mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

チェック

<20mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収 ふわっと崩れる



エルメッド エーザイ株式会社 エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

ブスター[®]M錠10/20

を服用される患者様へ

この薬の成分名は**ファモチジン**です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

チェック

<10mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

チェック

<20mg>



白色～微黄白色の
割線入りの素錠

〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収 ふわっと崩れる



エルメッド エーザイ株式会社 エーザイ株式会社

裏面もお読み下さい ▶

服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に
お飲みください。

■ ご自分の判断で
服用を中止しないで
ください。



■ ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

医療機関名

CODE MBS(1) 014
2016年1月作成

服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に
お飲みください。

■ ご自分の判断で
服用を中止しないで
ください。



■ ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

医療機関名

CODE MBS(1) 014
2016年1月作成

服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に
お飲みください。

■ ご自分の判断で
服用を中止しないで
ください。



■ ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

医療機関名

CODE MBS(1) 014
2016年1月作成

服用上の注意

■ お水やぬるま湯と一緒に
お飲みください。

■ ご自分の判断で
服用を中止しないで
ください。



■ ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

医療機関名

CODE MBS(1) 014
2016年1月作成