

エパルスタット錠50「EK」

を服用される方へ

この薬の成分は
エパルスタットです。

外形

色:白色

表 裏



服用にあたって

- ◆この薬は、特に医師からの指示がない場合は、食前(食事の約30～60分前)にお飲みください。
- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆この薬を飲むことにより尿の色が黄色～赤色になることがありますが、薬の成分の色によるものなので心配はありません。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



エルメッド エーザイ株式会社

CODE PEP(2) 001A
2018年3月作成

エパルスタット錠50「EK」

を服用される方へ

この薬の成分は
エパルスタットです。

外形

色:白色

表 裏



服用にあたって

- ◆この薬は、特に医師からの指示がない場合は、食前(食事の約30～60分前)にお飲みください。
- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆この薬を飲むことにより尿の色が黄色～赤色になることがありますが、薬の成分の色によるものなので心配はありません。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



エルメッド エーザイ株式会社

CODE PEP(2) 001A
2018年3月作成

エパルスタット錠50「EK」

を服用される方へ

この薬の成分は
エパルスタットです。

外形

色:白色

表 裏



服用にあたって

- ◆この薬は、特に医師からの指示がない場合は、食前(食事の約30～60分前)にお飲みください。
- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆この薬を飲むことにより尿の色が黄色～赤色になることがありますが、薬の成分の色によるものなので心配はありません。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



エルメッド エーザイ株式会社

CODE PEP(2) 001A
2018年3月作成

エパルスタット錠50「EK」

を服用される方へ

この薬の成分は
エパルスタットです。

外形

色:白色

表 裏



服用にあたって

- ◆この薬は、特に医師からの指示がない場合は、食前(食事の約30～60分前)にお飲みください。
- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆この薬を飲むことにより尿の色が黄色～赤色になることがありますが、薬の成分の色によるものなので心配はありません。
- ◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が
軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。



エルメッド エーザイ株式会社

CODE PEP(2) 001A
2018年3月作成