

ロラジンOD錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラジンです。

外形

色:白色の口腔内崩壊錠
(識別コード EE72)



◆このお薬は口腔内崩壊錠です。お水を含むとすぐに崩れる錠剤のため、下記①②いずれかの方法で服用してください。

- ①普通の薬と同様に、お水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ②唾液だけで服用することもできます。
舌の上のせて、唾液と一緒に飲み込んでください。

◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。

◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

※このお薬の製品名にあるOD錠とは、
Orally Disintegrating Tablet(口腔内崩壊錠)を意味します。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)010
2018年3月作成

ロラジンOD錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラジンです。

外形

色:白色の口腔内崩壊錠
(識別コード EE72)



◆このお薬は口腔内崩壊錠です。お水を含むとすぐに崩れる錠剤のため、下記①②いずれかの方法で服用してください。

- ①普通の薬と同様に、お水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ②唾液だけで服用することもできます。
舌の上のせて、唾液と一緒に飲み込んでください。

◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。

◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

※このお薬の製品名にあるOD錠とは、
Orally Disintegrating Tablet(口腔内崩壊錠)を意味します。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)010
2018年3月作成


ロラジンOD錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラジンです。

外形

色:白色の口腔内崩壊錠
(識別コード EE72)



◆このお薬は口腔内崩壊錠です。お水を含むとすぐに崩れる錠剤のため、下記①②いずれかの方法で服用してください。

- ①普通の薬と同様に、お水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ②唾液だけで服用することもできます。
舌の上のせて、唾液と一緒に飲み込んでください。

◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。

◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

※このお薬の製品名にあるOD錠とは、
Orally Disintegrating Tablet(口腔内崩壊錠)を意味します。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)010
2018年3月作成


ロラジンOD錠10mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロラジンです。

外形

色:白色の口腔内崩壊錠
(識別コード EE72)



◆このお薬は口腔内崩壊錠です。お水を含むとすぐに崩れる錠剤のため、下記①②いずれかの方法で服用してください。

- ①普通の薬と同様に、お水またはぬるま湯と一緒に服用してください。
- ②唾液だけで服用することもできます。
舌の上のせて、唾液と一緒に飲み込んでください。

◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。

◆ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

※このお薬の製品名にあるOD錠とは、
Orally Disintegrating Tablet(口腔内崩壊錠)を意味します。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE LOR(2)010
2018年3月作成