

ロサルタンK錠 25mg/50mg/100mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロサルタンカリウムです。

外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

割線入りの白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



裏面もかならず
お読みください。



ロサルタンK錠 25mg/50mg/100mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロサルタンカリウムです。

外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

割線入りの白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



裏面もかならず
お読みください。



ロサルタンK錠 25mg/50mg/100mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロサルタンカリウムです。

外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

割線入りの白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



裏面もかならず
お読みください。



ロサルタンK錠 25mg/50mg/100mg「EE」

を服用される方へ

この薬の成分はロサルタンカリウムです。

外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

割線入りの白色円形の
フィルムコーティング錠



外形

白色円形の
フィルムコーティング錠



裏面もかならず
お読みください。




服用にあたって

- コップ一杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 自動車の運転、高い所での作業などには十分注意してください。

血圧が下がることによって、立ちくらみ、めまい、ふらつきなどが起こることがあります。

お薬の副作用について

主な副作用として、頭痛、めまい、嘔吐・嘔気、ほてり、低血圧、疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE LOS(1)008
2018年3月作成

服用にあたって

- コップ一杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 自動車の運転、高い所での作業などには十分注意してください。

血圧が下がることによって、立ちくらみ、めまい、ふらつきなどが起こることがあります。

お薬の副作用について

主な副作用として、頭痛、めまい、嘔吐・嘔気、ほてり、低血圧、疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE LOS(1)008
2018年3月作成


服用にあたって

- コップ一杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 自動車の運転、高い所での作業などには十分注意してください。

血圧が下がることによって、立ちくらみ、めまい、ふらつきなどが起こることがあります。

お薬の副作用について

主な副作用として、頭痛、めまい、嘔吐・嘔気、ほてり、低血圧、疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE LOS(1)008
2018年3月作成

服用にあたって

- コップ一杯程度の水またはぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 自動車の運転、高い所での作業などには十分注意してください。

血圧が下がることによって、立ちくらみ、めまい、ふらつきなどが起こることがあります。

お薬の副作用について

主な副作用として、頭痛、めまい、嘔吐・嘔気、ほてり、低血圧、疲労などが報告されています。このような症状に気づいたら、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE LOS(1)008
2018年3月作成