

# ロキソプロフェンNaテープ50mg/100mg「EE」

を使用される方へ

50mg  100mg

このお薬は、**1日1回**患部に貼ってください。

貼るときには、次の点にご注意ください。

- 医師の指示どおりに使用してください。
- 傷口、粘膜(くちびるなど)、湿疹または発疹のある部位には貼らないでください。
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さま以外は使用しないでください。
- 続けて同じ部位に貼る場合は、1~2時間あけて皮膚を休ませてから貼ると、かぶれにくくなります。
- 汗はふきとってから貼ってください。(お風呂上がりに貼る場合は、汗がおさまってから貼ってください。)
- はがれ防止のため、貼り付けたあとに手のひらでテープ全体をしっかり押さえてください。

右のQRコードを携帯電話で読みとると、「ロキソプロフェンNaテープの貼り方」がご覧いただけます。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOX(1) 003  
2013年3月作成

# ロキソプロフェンNaテープ50mg/100mg「EE」

を使用される方へ

50mg  100mg

このお薬は、**1日1回**患部に貼ってください。

貼るときには、次の点にご注意ください。

- 医師の指示どおりに使用してください。
- 傷口、粘膜(くちびるなど)、湿疹または発疹のある部位には貼らないでください。
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さま以外は使用しないでください。
- 続けて同じ部位に貼る場合は、1~2時間あけて皮膚を休ませてから貼ると、かぶれにくくなります。
- 汗はふきとってから貼ってください。(お風呂上がりに貼る場合は、汗がおさまってから貼ってください。)
- はがれ防止のため、貼り付けたあとに手のひらでテープ全体をしっかり押さえてください。

右のQRコードを携帯電話で読みとると、「ロキソプロフェンNaテープの貼り方」がご覧いただけます。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOX(1) 003  
2013年3月作成

# ロキソプロフェンNaテープ50mg/100mg「EE」

を使用される方へ

50mg  100mg

このお薬は、**1日1回**患部に貼ってください。

貼るときには、次の点にご注意ください。

- 医師の指示どおりに使用してください。
- 傷口、粘膜(くちびるなど)、湿疹または発疹のある部位には貼らないでください。
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さま以外は使用しないでください。
- 続けて同じ部位に貼る場合は、1~2時間あけて皮膚を休ませてから貼ると、かぶれにくくなります。
- 汗はふきとってから貼ってください。(お風呂上がりに貼る場合は、汗がおさまってから貼ってください。)
- はがれ防止のため、貼り付けたあとに手のひらでテープ全体をしっかり押さえてください。

右のQRコードを携帯電話で読みとると、「ロキソプロフェンNaテープの貼り方」がご覧いただけます。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOX(1) 003  
2013年3月作成

# ロキソプロフェンNaテープ50mg/100mg「EE」

を使用される方へ

50mg  100mg

このお薬は、**1日1回**患部に貼ってください。

貼るときには、次の点にご注意ください。

- 医師の指示どおりに使用してください。
- 傷口、粘膜(くちびるなど)、湿疹または発疹のある部位には貼らないでください。
- 正しく安全に使用していただくため、処方された患者さま以外は使用しないでください。
- 続けて同じ部位に貼る場合は、1~2時間あけて皮膚を休ませてから貼ると、かぶれにくくなります。
- 汗はふきとってから貼ってください。(お風呂上がりに貼る場合は、汗がおさまってから貼ってください。)
- はがれ防止のため、貼り付けたあとに手のひらでテープ全体をしっかり押さえてください。

右のQRコードを携帯電話で読みとると、「ロキソプロフェンNaテープの貼り方」がご覧いただけます。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社

Eisai エーザイ株式会社

CODE LOX(1) 003  
2013年3月作成