


ガルメサルタンOD錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」


を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる** お薬です。


5mg表面



10mg表面



20mg表面



40mg表面



このお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。先発品と有効成分・効果・効能は変わりありません。

水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。ご自身の判断で服用を中止しないでください。


裏面もお読み下さい ▶

ガルメサルタンOD錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる** お薬です。


5mg表面



10mg表面



20mg表面



40mg表面



このお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。先発品と有効成分・効果・効能は変わりありません。

水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。ご自身の判断で服用を中止しないでください。


裏面もお読み下さい ▶

ガルメサルタンOD錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」


を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる** お薬です。


5mg表面



10mg表面



20mg表面



40mg表面



このお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。先発品と有効成分・効果・効能は変わりありません。

水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。ご自身の判断で服用を中止しないでください。

裏面もお読み下さい ▶

ガルメサルタンOD錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる** お薬です。


5mg表面



10mg表面



20mg表面



40mg表面



このお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。先発品と有効成分・効果・効能は変わりありません。

水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

寝たままの状態では、水なしでは飲まないでください。ご自身の判断で服用を中止しないでください。

裏面もお読み下さい ▶

オルメサルタン0D錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

服用にあたって

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE OLM(1)002
2017年11月作成

オルメサルタン0D錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

服用にあたって

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE OLM(1)002
2017年11月作成

オルメサルタン0D錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

服用にあたって

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE OLM(1)002
2017年11月作成

オルメサルタン0D錠5mg/10mg/20mg/40mg「EE」

服用にあたって

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE OLM(1)002
2017年11月作成