

パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「EE」

を服用される方へ

お薬の副作用について

監修：山寺博史先生（やまでらクリニック院長）

このお薬は、副作用として次のような症状がみられる場合があります。



頭痛



吐き気



眠気



めまい



口が渇く



便秘



食欲不振



不安やイライラ

治療のためには、お薬を飲み続けることが大切です。「副作用かな？」と思う症状があらわれた場合も、服用をやめてしまわずに、主治医または薬剤師にご相談ください。

ご家族のみなさまへ

服用することにより、不安、焦燥、興奮、敵意、怒りっぽくなるなどの症状が強くあらわれたり、衝動的に自分を傷つけたり、死にたいと思う場合があります。気になる変化がみられたときは、すぐに医師にご連絡ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「EE」

を服用される方へ

お薬の副作用について

監修：山寺博史先生（やまでらクリニック院長）

このお薬は、副作用として次のような症状がみられる場合があります。



頭痛



吐き気



眠気



めまい



口が渇く



便秘



食欲不振



不安やイライラ

治療のためには、お薬を飲み続けることが大切です。「副作用かな？」と思う症状があらわれた場合も、服用をやめてしまわずに、主治医または薬剤師にご相談ください。

ご家族のみなさまへ

服用することにより、不安、焦燥、興奮、敵意、怒りっぽくなるなどの症状が強くあらわれたり、衝動的に自分を傷つけたり、死にたいと思う場合があります。気になる変化がみられたときは、すぐに医師にご連絡ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「EE」

を服用される方へ

お薬の副作用について

監修：山寺博史先生（やまでらクリニック院長）

このお薬は、副作用として次のような症状がみられる場合があります。



頭痛



吐き気



眠気



めまい



口が渇く



便秘



食欲不振



不安やイライラ

治療のためには、お薬を飲み続けることが大切です。「副作用かな？」と思う症状があらわれた場合も、服用をやめてしまわずに、主治医または薬剤師にご相談ください。

ご家族のみなさまへ

服用することにより、不安、焦燥、興奮、敵意、怒りっぽくなるなどの症状が強くあらわれたり、衝動的に自分を傷つけたり、死にたいと思う場合があります。気になる変化がみられたときは、すぐに医師にご連絡ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「EE」

を服用される方へ

お薬の副作用について

監修：山寺博史先生（やまでらクリニック院長）

このお薬は、副作用として次のような症状がみられる場合があります。



頭痛



吐き気



眠気



めまい



口が渇く



便秘



食欲不振



不安やイライラ

治療のためには、お薬を飲み続けることが大切です。「副作用かな？」と思う症状があらわれた場合も、服用をやめてしまわずに、主治医または薬剤師にご相談ください。

ご家族のみなさまへ

服用することにより、不安、焦燥、興奮、敵意、怒りっぽくなるなどの症状が強くあらわれたり、衝動的に自分を傷つけたり、死にたいと思う場合があります。気になる変化がみられたときは、すぐに医師にご連絡ください。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

このお薬は、毎日飲み続けることが大切です

お薬の効果があらわれるまで、**4週間ほど**かかる場合もあります。効果がすぐにあらわれなくても、**あせらずに飲み続けましょう。**



生活での注意点

眠気やめまいなどがおこる場合がありますので、**車の運転など危険をとまなう機械の操作**は十分に注意してください。

アルコールはお薬の作用を強める恐れがありますので、飲酒をさけてください。



ハーブの一種である、**セイヨウトギリソウ**を含む食品は、お薬の作用を強める恐れがありますので、十分に注意してください。

要注意



要注意



CODE PAR (1) 010A
2016年3月作成

このお薬は、毎日飲み続けることが大切です

お薬の効果があらわれるまで、**4週間ほど**かかる場合もあります。効果がすぐにあらわれなくても、**あせらずに飲み続けましょう。**



生活での注意点

眠気やめまいなどがおこる場合がありますので、**車の運転など危険をとまなう機械の操作**は十分に注意してください。

アルコールはお薬の作用を強める恐れがありますので、飲酒をさけてください。



ハーブの一種である、**セイヨウトギリソウ**を含む食品は、お薬の作用を強める恐れがありますので、十分に注意してください。

要注意



要注意



CODE PAR (1) 010A
2016年3月作成

このお薬は、毎日飲み続けることが大切です

お薬の効果があらわれるまで、**4週間ほど**かかる場合もあります。効果がすぐにあらわれなくても、**あせらずに飲み続けましょう。**



生活での注意点

眠気やめまいなどがおこる場合がありますので、**車の運転など危険をとまなう機械の操作**は十分に注意してください。

アルコールはお薬の作用を強める恐れがありますので、飲酒をさけてください。



ハーブの一種である、**セイヨウトギリソウ**を含む食品は、お薬の作用を強める恐れがありますので、十分に注意してください。

要注意



要注意



CODE PAR (1) 010A
2016年3月作成

このお薬は、毎日飲み続けることが大切です

お薬の効果があらわれるまで、**4週間ほど**かかる場合もあります。効果がすぐにあらわれなくても、**あせらずに飲み続けましょう。**



生活での注意点

眠気やめまいなどがおこる場合がありますので、**車の運転など危険をとまなう機械の操作**は十分に注意してください。

アルコールはお薬の作用を強める恐れがありますので、飲酒をさけてください。



ハーブの一種である、**セイヨウトギリソウ**を含む食品は、お薬の作用を強める恐れがありますので、十分に注意してください。

要注意



要注意



CODE PAR (1) 010A
2016年3月作成