

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg/0.5mg「EE」

を服用される患者さまとご家族のみなさまへ

このおくすりを正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。


**ご自分の判断でくすりの服用を中止したり、  
飲む量を変えたりしないでください。**

勝手にくすりの服用を中止したり減量すると、ごくまれに高熱、筋肉のこわばり、意識がうすれるなどの重い副作用が出る場合があります。

とつ ぼつ てき すい みん  
**突発的睡眠**

前兆もなく、突然眠り込むことがあります。  
車の運転や危険な作業(機械の操作、高い所での作業など)は行わないでください。

このおくすりを服用すると、  
何の前ぶれもなく、急に眠り  
こんでしまうことがあります。  
事故に結びつく可能性  
があるので、自動車の運転、  
危険を伴う機械の操作、  
高所作業などは行わないで  
ください。



うら面も必ずお読みください

PRA(1)002A

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg/0.5mg「EE」

を服用される患者さまとご家族のみなさまへ

このおくすりを正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。


**ご自分の判断でくすりの服用を中止したり、  
飲む量を変えたりしないでください。**

勝手にくすりの服用を中止したり減量すると、ごくまれに高熱、筋肉のこわばり、意識がうすれるなどの重い副作用が出る場合があります。

とつ ぼつ てき すい みん  
**突発的睡眠**

前兆もなく、突然眠り込むことがあります。  
車の運転や危険な作業(機械の操作、高い所での作業など)は行わないでください。

このおくすりを服用すると、  
何の前ぶれもなく、急に眠り  
こんでしまうことがあります。  
事故に結びつく可能性  
があるので、自動車の運転、  
危険を伴う機械の操作、  
高所作業などは行わないで  
ください。



うら面も必ずお読みください

PRA(1)002A

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg/0.5mg「EE」

を服用される患者さまとご家族のみなさまへ

このおくすりを正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。


**ご自分の判断でくすりの服用を中止したり、  
飲む量を変えたりしないでください。**

勝手にくすりの服用を中止したり減量すると、ごくまれに高熱、筋肉のこわばり、意識がうすれるなどの重い副作用が出る場合があります。

とつ ぼつ てき すい みん  
**突発的睡眠**

前兆もなく、突然眠り込むことがあります。  
車の運転や危険な作業(機械の操作、高い所での作業など)は行わないでください。

このおくすりを服用すると、  
何の前ぶれもなく、急に眠り  
こんでしまうことがあります。  
事故に結びつく可能性  
があるので、自動車の運転、  
危険を伴う機械の操作、  
高所作業などは行わないで  
ください。



うら面も必ずお読みください

PRA(1)002A

プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg/0.5mg「EE」

を服用される患者さまとご家族のみなさまへ

このおくすりを正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。


**ご自分の判断でくすりの服用を中止したり、  
飲む量を変えたりしないでください。**

勝手にくすりの服用を中止したり減量すると、ごくまれに高熱、筋肉のこわばり、意識がうすれるなどの重い副作用が出る場合があります。

とつ ぼつ てき すい みん  
**突発的睡眠**

前兆もなく、突然眠り込むことがあります。  
車の運転や危険な作業(機械の操作、高い所での作業など)は行わないでください。

このおくすりを服用すると、  
何の前ぶれもなく、急に眠り  
こんでしまうことがあります。  
事故に結びつく可能性  
があるので、自動車の運転、  
危険を伴う機械の操作、  
高所作業などは行わないで  
ください。



うら面も必ずお読みください

PRA(1)002A

しょうどうせいぎょしょうがい  
**衝動制御障害について**

このおくすりを服用すると  
次のような症状があらわれることがあります。



ギャンブル依存 病的な  
性欲亢進 買い物依存 暴食

もし、このような症状があらわれたら  
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

EMEC エルメット エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

CODE PRA(1)002A  
2013年7月作成

しょうどうせいぎょしょうがい  
**衝動制御障害について**

このおくすりを服用すると  
次のような症状があらわれることがあります。



ギャンブル依存 病的な  
性欲亢進 買い物依存 暴食

もし、このような症状があらわれたら  
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

EMEC エルメット エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

CODE PRA(1)002A  
2013年7月作成

しょうどうせいぎょしょうがい  
**衝動制御障害について**

このおくすりを服用すると  
次のような症状があらわれることがあります。



ギャンブル依存 病的な  
性欲亢進 買い物依存 暴食

もし、このような症状があらわれたら  
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

EMEC エルメット エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

CODE PRA(1)002A  
2013年7月作成

しょうどうせいぎょしょうがい  
**衝動制御障害について**

このおくすりを服用すると  
次のような症状があらわれることがあります。



ギャンブル依存 病的な  
性欲亢進 買い物依存 暴食

もし、このような症状があらわれたら  
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

医療機関名

EMEC エルメット エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

CODE PRA(1)002A  
2013年7月作成