

ロイコトリエン受容体拮抗剤  
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

# プラナルカストDS10%「EK」

## 体重別換算表

体重(kg)	プラナルカスト水和物 体重当たりの投与量 (7mg/kg/日)
	ドライシロップ1日量(g) (1日2分服)
5	0.35
6	0.42
7	0.49
8	0.56
9	0.63
10	0.70
11	0.77
12	0.84
13	0.91
14	0.98
15	1.05
16	1.12
17	1.19
18	1.26
19	1.33
20	1.40
21	1.47
22	1.54
23	1.61
24	1.68
25	1.75
26	1.82
27	1.89

体重(kg)	プラナルカスト水和物 体重当たりの投与量 (7mg/kg/日)
	ドライシロップ1日量(g) (1日2分服)
28	1.96
29	2.03
30	2.10
31	2.17
32	2.24
33	2.31
34	2.38
35	2.45
36	2.52
37	2.59
38	2.66
39	2.73
40	2.80
41	2.87
42	2.94
43	3.01
44	3.08
45	3.15
46	3.22
47	3.29
48	3.36
49	3.43
50	3.50

●効能・効果、用法・用量については裏面をご参照ください。  
禁忌を含む使用上の注意については添付文書をご参照ください。

ロイコトリエン受容体拮抗剤  
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

# プラナルカストDS10%「EK」

## 【効能・効果】

気管支喘息、アレルギー性鼻炎

## 【用法・用量】

通常、小児にはプラナルカスト水和物として1日量7mg/kg（ドライシロップとして70mg/kg）を朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。1日最高用量はプラナルカスト水和物として10mg/kg（ドライシロップとして100mg/kg）とする。ただし、プラナルカスト水和物として成人の通常用量である450mg/日（ドライシロップとして4.5g/日）を超えないこと。

体重別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回、朝食後および夕食後に経口投与する。

体重	ドライシロップ1回量
12kg以上 18kg未満	0.5g（プラナルカスト水和物として50mg）
18kg以上 25kg未満	0.7g（プラナルカスト水和物として70mg）
25kg以上 35kg未満	1.0g（プラナルカスト水和物として100mg）
35kg以上 45kg未満	1.4g（プラナルカスト水和物として140mg）



エルメッド エーザイ株式会社