

クエチアピン 細粒50%「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、クエチアピルフマル酸塩です。



このお薬は、
白色の細粒剤です。

このお薬の飲み方

- 1回25mgを1日2~3回服用から開始します。
- 状態にあわせて徐々に増量し、
1日150mg~600mgを
2回または3回に分けて服用します。
※必ず医師からの指示にしたがって服用してください。
※1日の用量が750mgを超えることはありません。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに、
できるだけ早く1回分を飲んでください。
※次の服用時間が近い場合は、1回分をとばし、
次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。
(絶対に2回分を一度に飲んではいけません)



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

クエチアピン 細粒50%「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、クエチアピルフマル酸塩です。



このお薬は、
白色の細粒剤です。

このお薬の飲み方

- 1回25mgを1日2~3回服用から開始します。
- 状態にあわせて徐々に増量し、
1日150mg~600mgを
2回または3回に分けて服用します。
※必ず医師からの指示にしたがって服用してください。
※1日の用量が750mgを超えることはありません。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに、
できるだけ早く1回分を飲んでください。
※次の服用時間が近い場合は、1回分をとばし、
次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。
(絶対に2回分を一度に飲んではいけません)



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

クエチアピン 細粒50%「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、クエチアピルフマル酸塩です。



このお薬は、
白色の細粒剤です。

このお薬の飲み方

- 1回25mgを1日2~3回服用から開始します。
- 状態にあわせて徐々に増量し、
1日150mg~600mgを
2回または3回に分けて服用します。
※必ず医師からの指示にしたがって服用してください。
※1日の用量が750mgを超えることはありません。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに、
できるだけ早く1回分を飲んでください。
※次の服用時間が近い場合は、1回分をとばし、
次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。
(絶対に2回分を一度に飲んではいけません)



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

クエチアピン 細粒50%「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、クエチアピルフマル酸塩です。



このお薬は、
白色の細粒剤です。

このお薬の飲み方

- 1回25mgを1日2~3回服用から開始します。
- 状態にあわせて徐々に増量し、
1日150mg~600mgを
2回または3回に分けて服用します。
※必ず医師からの指示にしたがって服用してください。
※1日の用量が750mgを超えることはありません。
- 飲み忘れた場合は、気がついたときに、
できるだけ早く1回分を飲んでください。
※次の服用時間が近い場合は、1回分をとばし、
次の通常の服用時間に1回分を飲んでください。
(絶対に2回分を一度に飲んではいけません)



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

服用・保管上の注意点

- 多く飲んでしまった場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
※多く飲んでしまった場合、ぼんやりする、静かになる、脈が早くなる、血圧が下がることがあります。また昏睡状態になる可能性もあります。いくつかの症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- 自分の判断で服用をやめないでください。
- 次のような方は、**事前に医師・薬剤師にご相談ください。**

糖尿病
インスリン
糖尿病または既往歴がある。

肥満
高血糖
家族に糖尿病の方がいる、または高血糖や肥満など糖尿病危険因子を持っている。

これまでに
お薬を飲んで、
かゆみ、発疹などの
アレルギー症状が
出たことがある。

ほかのお薬を
服用している。
(薬局で購入した)
お薬も含みます

妊娠または
授乳中である。

- お薬は、お子さまの手の届かないところで、
直射日光や高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管せずに廃棄してください。
※廃棄方法は、受け取った薬局にご相談ください。

CODE QUE(1)003
2012年11月作成

服用・保管上の注意点

- 多く飲んでしまった場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
※多く飲んでしまった場合、ぼんやりする、静かになる、脈が早くなる、血圧が下がることがあります。また昏睡状態になる可能性もあります。いくつかの症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- 自分の判断で服用をやめないでください。
- 次のような方は、**事前に医師・薬剤師にご相談ください。**

糖尿病
インスリン
糖尿病または既往歴がある。

肥満
高血糖
家族に糖尿病の方がいる、または高血糖や肥満など糖尿病危険因子を持っている。

これまでに
お薬を飲んで、
かゆみ、発疹などの
アレルギー症状が
出たことがある。

ほかのお薬を
服用している。
(薬局で購入した)
お薬も含みます

妊娠または
授乳中である。

- お薬は、お子さまの手の届かないところで、
直射日光や高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管せずに廃棄してください。
※廃棄方法は、受け取った薬局にご相談ください。

CODE QUE(1)003
2012年11月作成

服用・保管上の注意点

- 多く飲んでしまった場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
※多く飲んでしまった場合、ぼんやりする、静かになる、脈が早くなる、血圧が下がることがあります。また昏睡状態になる可能性もあります。いくつかの症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- 自分の判断で服用をやめないでください。
- 次のような方は、**事前に医師・薬剤師にご相談ください。**

糖尿病
インスリン
糖尿病または既往歴がある。

肥満
高血糖
家族に糖尿病の方がいる、または高血糖や肥満など糖尿病危険因子を持っている。

これまでに
お薬を飲んで、
かゆみ、発疹などの
アレルギー症状が
出たことがある。

ほかのお薬を
服用している。
(薬局で購入した)
お薬も含みます

妊娠または
授乳中である。

- お薬は、お子さまの手の届かないところで、
直射日光や高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管せずに廃棄してください。
※廃棄方法は、受け取った薬局にご相談ください。

CODE QUE(1)003
2012年11月作成

服用・保管上の注意点

- 多く飲んでしまった場合は、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
※多く飲んでしまった場合、ぼんやりする、静かになる、脈が早くなる、血圧が下がることがあります。また昏睡状態になる可能性もあります。いくつかの症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。
- 自分の判断で服用をやめないでください。
- 次のような方は、**事前に医師・薬剤師にご相談ください。**

糖尿病
インスリン
糖尿病または既往歴がある。

肥満
高血糖
家族に糖尿病の方がいる、または高血糖や肥満など糖尿病危険因子を持っている。

これまでに
お薬を飲んで、
かゆみ、発疹などの
アレルギー症状が
出たことがある。

ほかのお薬を
服用している。
(薬局で購入した)
お薬も含みます

妊娠または
授乳中である。

- お薬は、お子さまの手の届かないところで、
直射日光や高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管せずに廃棄してください。
※廃棄方法は、受け取った薬局にご相談ください。

CODE QUE(1)003
2012年11月作成