

シンバスタチン錠10mg/20mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

白色の素錠



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。



※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

シンバスタチン錠10mg/20mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

白色の素錠



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。



※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

シンバスタチン錠10mg/20mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

白色の素錠



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。



※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

シンバスタチン錠10mg/20mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

白色の素錠



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

- ◆お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。



※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い ■手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 003A
2018年3月作成

お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い ■手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 003A
2018年3月作成

お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い ■手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 003A
2018年3月作成

お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い ■手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 003A
2018年3月作成