

# シンバスタチン錠5mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

## 外形

白色の割線入りの素錠



## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

# シンバスタチン錠5mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

## 外形

白色の割線入りの素錠



## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

# シンバスタチン錠5mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

## 外形

白色の割線入りの素錠



## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

# シンバスタチン錠5mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らすお薬です。

## 外形

白色の割線入りの素錠



## 〈服用にあたって〉

少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに「ふわっ」と崩れる錠剤です。

速やかに水を吸収      ふわっと崩れる



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

※ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い
- 手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

### \*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

## 食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 002A  
2018年3月作成

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

### \*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

## 食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 002A  
2018年3月作成

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。


- 筋肉が痛い
- 手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

### \*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

## 食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 002A  
2018年3月作成

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性ありますので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはらない
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

### \*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

## 食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE SIM(2) 002A  
2018年3月作成