

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ


処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること
広範囲経口抗菌剤

2010年8月


ルフロキサシン錠100「EMEC」

ルフロキサシン錠200「EMEC」


〈ノルフロキサシン錠〉

製造販売元 

サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

販売元 

エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携 

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.192に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

〔改訂箇所及び改訂理由（項目別）〕

1. 慎重投与

下線部分を追加いたしました。

改訂後	改訂前
<p>1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <p>(1) 高度の腎障害のある患者 〔高い血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて投与すること。〕</p> <p>(2) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者 〔痙攣を起こすことがある。〕</p> <p><u>(3) 重症筋無力症の患者</u> <u>〔症状を悪化させることがある。〕</u></p> <p>(4) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕</p>	<p>1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）</p> <p>(1) 高度の腎障害のある患者 〔高い血中濃度が持続するので、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて投与すること。〕</p> <p>(2) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者 〔痙攣を起こすことがある。〕</p> <p>(3) 高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕</p>

改訂理由

平成22年8月10日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課 事務連絡及び自主改訂に基づき、「慎重投与」の項を改訂いたしました。